




30001342 - ND3804
IFU FUJI PLUS GC CAPSULES EEP



GC Fuji PLUS™ CAPSULE

RADIOPAQUE REINFORCED GLASS IONOMER LUTING CEMENT IN CAPSULES

For use only by a dental professional in the indications for use.



INDICATIONS FOR USE

- Direct pulp-based inlays, onlays, crowns and bridges
- Restoration of resin inlays, onlays, crowns and bridges
- Cementation of all ceramic inlays
- Cementation of high strength (zirconia based) all ceramic crowns and bridges
- Cementation of metal, ceramic and fiber posts

CONTRAINDICATIONS

- Direct pulp capping
- Avoid use of this product in patients with known allergies to glass ionomer cement, methacrylate monomer or methacrylate polymer

COMPOSITION

Powder: Fluoro-alumino-silicate glass, initiator, pigment.
Liquid: Methacrylate, distilled water, polyacrylic acid, dimethacrylate, carboxylic acid, stabilizer.

DIRECTIONS FOR USE

Powder / Liquid ratio (g/g)	0,36 / 0,18
Mixing time (sec.)	10*
Working Time (23 °C / 73°F) (min., sec.)	200*
Setting Time(37 °C/99°F) (min., sec.)	415*

ISO 9917-2 Class 1, Luting Radio-opaque: Its radiopacity is equivalent to 2.1 mm or 210% aluminum. (The radiopacity of aluminum is comparable to dentin.)

1. TOOTH PREPARATION

- Prepare tooth in usual manner. For direct pulp capping, use calcium hydroxide.
- Clean the prepared teeth with pumice and water.
- Note: Apply GC Fuji PLUS CONDITIONER for 20 seconds using a cotton pellet or sponge.
- Rinse thoroughly with water. Remove excess moisture by blotting with a cotton pellet or gently blowing with an oil-free air. DO NOT DESICCATE. Best results are obtained when prepared teeth are kept moist (glazing).

2. RESTORATION PREPARATION

- Make sure that the restoration is pretreated and handed according to manufacturer's instructions.
3. CAPSULE APPLICATION AND MIXING
 - Before activation, shake the capsule or put its side on a hard surface to loosen the powder (Fig. 1).
 - The capsule should be activated just before mixing and use immediately.

- Ensure the plunger is fully pressed to avoid the incorrect mixing ratio of powder and liquid.
- The capsule should be activated just before mixing and used immediately.

- Immediately mix into a mixer (or an amalgamator) and mix for 10 seconds (+/- 4,000 RPM) (Fig. 3).
- Note: When using a rotational mixing device, it is recommended not to exceed the centrifuge option.

4. DISPENSING

- Immediately remove the mixed capsule from the mixer and load it into the GC CAPSULE APPLIER.
- Make two clicks to prime the capsule (Fig. 4). To adjust the direction of the nozzle, hold the applicer with the capsule towards you and turn the capsule, push the plunger until it is fully depressed with the main body and hold it down for 2 seconds (Fig. 2).
- Extrude directly into the restoration (Fig. 5).
- To remove the used capsule, push the applicer release button.

5. CEMENTATION

- Coat the internal surface of the restoration with sufficient cement and seat immediately. The working time is 2 minutes from start of mixing at 23°C (73°F). Higher temperatures will shorten working time.
- For more complex procedures requiring longer working time, it is recommended to refrigerate the capsules in the original aluminum foil.
- Start removing excess cement when the excess cement feels firm (Fig. 6).
- Finishing can be started 4 minutes 15 seconds after seating the restoration.

STORAGE

Recommended for optimal performance, store the capsules in the original aluminum foil in a cool and dark place 4-25°C (39-77.0°F).

SHADES

Yellow A3 (Vita® shade)
Vita® is a registered trademark of Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germany.

PACKAGE

50 capsules
Average contents per capsule: 0.36 g powder and 0.18 g (0.16 mL) liquid.
Minimum net volume of mixed cement per capsule: 0.19 mL.
Option: GC CAPSULE APPLIER (1 piece)

CAUTION

- In case of contact with oral tissue or skin, remove immediately with a sponge or cotton soaked in alcohol. Flush with water. To avoid contact, a rubber dam and/or COCCA BUTTER can be used to isolate the operation field from the skin or oral tissue.
- In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.
- GC Fuji PLUS CONDITIONER contains 2% Ferric Chloride. It is not recommended to use GC Fuji PLUS CONDITIONER in combination with products containing Euphrasine as this may stain oral tissue.
- Do not use GC Fuji PLUS CAPSULE in combination with eugenol containing materials as eugenol may hinder GC Fuji PLUS CAPSULE from setting or bonding properly.
- This product is not indicated for filling or core build-up.
- In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any such changes are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.
- Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear should always be worn.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the safety data sheets available at: <https://www.gc.dental/europe>

For the Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP) please see EUDAMED database (<https://ec.europa.eu/tools/eudamed/>) or contact us at Regulatory_gcc@gc.dental

Undesired effects - Reporting: If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by use of this product, including those not listed in this instruction for use, please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the proper authority of your country accessible through the following link: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en as well as to our internal vigilance system: <https://www.gcc.dental/europe>. In this way you will contribute to improve the safety of this product.

Last revised: 12/2024

Postná redakcia: 12/2024



GC Fuji PLUS™ CAPSULE

REINTEGROKONTRASTEN PODSILILEN GLAS-IONOMER ZA ČIMENTIRANJE V KAPSLU

Da se izpolnjava samo od dentálni lekári, spazajni instruktivni za upotreba.

INDIKACIJA ZA UPOTREBU

- Čimbeni nalet na inleji, onleji, koroni i mostove s metalna osnovu.
- Čimentiranje na kompozitni inleji, onleji, koroni i mostove.
- Čimbeni nalet na izlazu keramičkim inleji, onleji, korunka e visokom otpornosti na udarce (cirkonijum).
- Čimentiranje na keramičkim inleji, onleji, korunka e visokom otpornosti na udarce (cirkonijum).
- Čimbeni nalet na keramičkim inleji, onleji, korunka e visokom otpornosti na udarce (cirkonijum).

KONTRAINDIKACIJA

- Bezobnaletna upotreba na tozi produkt pri pacijenti s izvestni alergiji kim glas-ionomeri cement, metakrilatnem monomer ili metakrilatni polimer.

ČYBŠTAV

Prak: Fluoro-alumino-silikatno staklo, inicijator, pigment Tenost: Metakrilat, Destilirana voda, Poliakrilat kiseline, Dimetakrilat, Karboksilovna kiselina

NASOKI ZA UPOTREBU

Štošenostie prah/tekućina (r/r)	0,36 / 0,18
Vreme za smesavanje (sek.)	10*
Vreme za radu (pri 23 °C) (min.sek.)	200*
Vreme za vtvrdavanje (37°C/99°F) (min., sek.)	415*

ISO 9917-2 Klas 1 Čimentirano Radiopropozna: Njegova radiopropozna je ekvivalentna 2,1 mm ili 210% aluminija. (Radiopropoznost aluminija je srovnatljiva s dentinom.)

1. PODGOTAVKA ZUBA

- Podgotovite zub po običajni način. Za direktno pulpno pokriente na pulputa, upotrebljavajte kalcijev hidroksid.
- Čišćenje pripremljenih zuba pumicom i vodom.
- Za obilježavanje adhezivna nanosite s pamučnim tuferom ili vatom na pripremljene zubne pripreme.
- Proimite obilježavanje. Odstarite izmislizata vlna prah polipane s pamučni tufer ili s leka vlnuzišta stranu. NE DESICIRAJTE. Najbolji rezultati dobivaju se kada su pripremljeni zubni pripremi ostali vlažni (glaziranje).

2. PODGOTAVKA NA VYSTAVNOVANJE TO
- Podgotovite površnostie površnostie (beskvasni).

2. PRIKUPAVANJE IZ VYSTAVNOVANJE TO
- Podgotovite površnostie površnostie (beskvasni).

3. AKTIVIRANJE NA KAPSLUITE I SMESAVANJE
- Pred aktiviranje, raslojavajte kapsulu ili je poukuvajte vrućom vodom površnostie za da razvraštate (Fig. 2).

3. AKTIVIRANJE NA KAPSLUITE I SMESAVANJE
- Pred aktiviranje, raslojavajte kapsulu ili je poukuvajte vrućom vodom površnostie za da razvraštate (Fig. 2).

3. AKTIVIRANJE NA KAPSLUITE I SMESAVANJE
- Pred aktiviranje, raslojavajte kapsulu ili je poukuvajte vrućom vodom površnostie za da razvraštate (Fig. 2).

3. AKTIVIRANJE NA KAPSLUITE I SMESAVANJE
- Pred aktiviranje, raslojavajte kapsulu ili je poukuvajte vrućom vodom površnostie za da razvraštate (Fig. 2).

3. AKTIVIRANJE NA KAPSLUITE I SMESAVANJE
- Pred aktiviranje, raslojavajte kapsulu ili je poukuvajte vrućom vodom površnostie za da razvraštate (Fig. 2).

3. AKTIVIRANJE NA KAPSLUITE I SMESAVANJE
- Pred aktiviranje, raslojavajte kapsulu ili je poukuvajte vrućom vodom površnostie za da razvraštate (Fig. 2).

3. AKTIVIRANJE NA KAPSLUITE I SMESAVANJE
- Pred aktiviranje, raslojavajte kapsulu ili je poukuvajte vrućom vodom površnostie za da razvraštate (Fig. 2).

3. AKTIVIRANJE NA KAPSLUITE I SMESAVANJE
- Pred aktiviranje, raslojavajte kapsulu ili je poukuvajte vrućom vodom površnostie za da razvraštate (Fig. 2).

3. AKTIVIRANJE NA KAPSLUITE I SMESAVANJE
- Pred aktiviranje, raslojavajte kapsulu ili je poukuvajte vrućom vodom površnostie za da razvraštate (Fig. 2).

3. AKTIVIRANJE NA KAPSLUITE I SMESAVANJE
- Pred aktiviranje, raslojavajte kapsulu ili je poukuvajte vrućom vodom površnostie za da razvraštate (Fig. 2).

3. AKTIVIRANJE NA KAPSLUITE I SMESAVANJE
- Pred aktiviranje, raslojavajte kapsulu ili je poukuvajte vrućom vodom površnostie za da razvraštate (Fig. 2).

3. AKTIVIRANJE NA KAPSLUITE I SMESAVANJE
- Pred aktiviranje, raslojavajte kapsulu ili je poukuvajte vrućom vodom površnostie za da razvraštate (Fig. 2).

3. AKTIVIRANJE NA KAPSLUITE I SMESAVANJE
- Pred aktiviranje, raslojavajte kapsulu ili je poukuvajte vrućom vodom površnostie za da razvraštate (Fig. 2).

3. AKTIVIRANJE NA KAPSLUITE I SMESAVANJE
- Pred aktiviranje, raslojavajte kapsulu ili je poukuvajte vrućom vodom površnostie za da razvraštate (Fig. 2).

3. AKTIVIRANJE NA KAPSLUITE I SMESAVANJE
- Pred aktiviranje, raslojavajte kapsulu ili je poukuvajte vrućom vodom površnostie za da razvraštate (Fig. 2).

3. AKTIVIRANJE NA KAPSLUITE I SMESAVANJE
- Pred aktiviranje, raslojavajte kapsulu ili je poukuvajte vrućom vodom površnostie za da razvraštate (Fig. 2).

3. AKTIVIRANJE NA KAPSLUITE I SMESAVANJE
- Pred aktiviranje, raslojavajte kapsulu ili je poukuvajte vrućom vodom površnostie za da razvraštate (Fig. 2).

3. AKTIVIRANJE NA KAPSLUITE I SMESAVANJE
- Pred aktiviranje, raslojavajte kapsulu ili je poukuvajte vrućom vodom površnostie za da razvraštate (Fig. 2).

3. AKTIVIRANJE NA KAPSLUITE I SMESAVANJE
- Pred aktiviranje, raslojavajte kapsulu ili je poukuvajte vrućom vodom površnostie za da razvraštate (Fig. 2).

3. AKTIVIRANJE NA KAPSLUITE I SMESAVANJE
- Pred aktiviranje, raslojavajte kapsulu ili je poukuvajte vrućom vodom površnostie za da razvraštate (Fig. 2).

3. AKTIVIRANJE NA KAPSLUITE I SMESAVANJE
- Pred aktiviranje, raslojavajte kapsulu ili je poukuvajte vrućom vodom površnostie za da razvraštate (Fig. 2).

3. AKTIVIRANJE NA KAPSLUITE I SMESAVANJE
- Pred aktiviranje, raslojavajte kapsulu ili je poukuvajte vrućom vodom površnostie za da razvraštate (Fig. 2).

3. AKTIVIRANJE NA KAPSLUITE I SMESAVANJE
- Pred aktiviranje, raslojavajte kapsulu ili je poukuvajte vrućom vodom površnostie za da razvraštate (Fig. 2).

3. AKTIVIRANJE NA KAPSLUITE I SMESAVANJE
- Pred aktiviranje, raslojavajte kapsulu ili je poukuvajte vrućom vodom površnostie za da razvraštate (Fig. 2).

3. AKTIVIRANJE NA KAPSLUITE I SMESAVANJE
- Pred aktiviranje, raslojavajte kapsulu ili je poukuvajte vrućom vodom površnostie za da razvraštate (Fig. 2).

3. AKTIVIRANJE NA KAPSLUITE I SMESAVANJE
- Pred aktiviranje, raslojavajte kapsulu ili je poukuvajte vrućom vodom površnostie za da razvraštate (Fig. 2).

3. AKTIVIRANJE NA KAPSLUITE I SMESAVANJE
- Pred aktiviranje, raslojavajte kapsulu ili je poukuvajte vrućom vodom površnostie za da razvraštate (Fig. 2).


3. AKTIVIRANJE NA KAPSLUITE I SMESAVANJE
- Pred aktiviranje, raslojavajte kapsulu ili je poukuvajte vrućom vodom površnostie za da razvraštate (Fig. 2).

3. AKTIVIRANJE NA KAPSLUITE I SMESAVANJE
- Pred aktiviranje, raslojavajte kapsulu ili je poukuvajte vrućom vodom površnostie za da razvraštate (Fig. 2).

3. AKTIVIRANJE NA KAPSLUITE I SMESAVANJE
- Pred aktiviranje, raslojavajte kapsulu ili je poukuvajte vrućom vodom površnostie za da razvraštate (Fig. 2).

3. AKTIVIRANJE NA KAPSLUITE I SMESAVANJE
- Pred aktiviranje, raslojavajte kapsulu ili je poukuvajte vrućom vodom površnostie za da razvraštate (Fig. 2).

3. AKTIVIRANJE NA KAPSLUITE I SMESAVANJE
- Pred aktiviranje, raslojavajte kapsulu ili je poukuvajte vrućom vodom površnostie za da razvraštate (Fig. 2).



GC Fuji PLUS™ CAPSULE

RADIOPIQUE REINFORCED GLASS IONOMERNI FIXAČNI CEMENT V KAPSLICH

Určeno výhradně k použití ve stomatologické praxi v doporučených indikacích.

INDIKACE K POUŽITÍ

- Cementování všech typů kovových inlajů, onlajů, korunek a mostků.
- Cementování všech typů pryskyřičných inlajů, onlajů, korunek a mostků.
- Cementování všech keramických inlajů, onlajů, korunek a mostků.
- Cementování všech korunek a mostků zhotovených z keramiky s vyšší povrchovou tvrdostí (cirkonium).
- Cementování kovových a keramických čepů, čepů ze skelného vlákn.

KONTRAINDIKACE

- Příjemce tohoto produktu u pacientů se známou alergií na složky cementu, metakrylátový monomer nebo metakrylátový polymer.

SLOŽENÍ

Prášek: Fluor-hlinito-křemíkové sklo, Inicijátor, Pigment Tekutina: Metakrylát, Destilovaná voda, Kyselina polyakrylová, Dimetakrylát, Karboxylová kyselina

NAVOD K POUŽITÍ

Omjer prask / tekućina (g/g)	0,36 / 0,18
Pravek/tekućina poměr (g/g)	0,36 / 0,18
Miçaçiñ ças (sek.)	10*
Pracovní čas (min. sek.) (při 23°C)	200*
čas tuhnutí (37°C/99°F) (min., sek.)	415*

ISO 9917-2 Třída 1, Fixační Radiopropozna: Njegova radiopropozna odpovídá 2,1 mm nebo 210 % hliníku. (Radiopropozna hliníku je srovnatelná s dentinem.)

1. PŘIPRAVA ZUBU

- Připravte zub běžným způsobem. Pro ukrytí přímé pulpy použijte hydroxid vápenatý.
- Čištění připravených zubů pumicí a vodou.
- Applikuje GC Fuji PLUS KONDICIONÉR na 20 sekund za pomoci Fuji PLUS CONDITIONER za 20 sekund.
- Důkladně opláchněte vodou. Odstraňte přebytečnou vlhkost vatovým tampónem nebo jemně vysušte vzduchem (bez oleje).

2. PŘIPRAVA NÁHRADY
- Před aktivací, rozložte kapsli do prázdna.

3. AKTIVACE KAPSELE A MICHÁNÍ
- Před aktivací kapsle ji zatřepájte nebo poklepejte boční stranou kapsle o tvrdou podložku, aby se uvolnil prášek (obr. 1).

3. AKTIVACE KAPSELE A MICHÁNÍ
- Před aktivací kapsle ji zatřepájte nebo poklepejte boční stranou kapsle o tvrdou podložku, aby se uvolnil prášek (obr. 1).

3. AKTIVACE KAPSELE A MICHÁNÍ
- Před aktivací kapsle ji zatřepájte nebo poklepejte boční stranou kapsle o tvrdou podložku, aby se uvolnil prášek (obr. 1).

3. AKTIVACE KAPSELE A MICHÁNÍ
- Před aktivací kapsle ji zatřepájte nebo poklepejte boční stranou kapsle o tvrdou podložku, aby se uvolnil prášek (obr. 1).

3. AKTIVACE KAPSELE A MICHÁNÍ
- Před aktivací kapsle ji zatřepájte nebo poklepejte boční stranou kapsle o tvrdou podložku, aby se uvolnil prášek (obr. 1).

3. AKTIVACE KAPSELE A MICHÁNÍ
- Před aktivací kapsle ji zatřepájte nebo poklepejte boční stranou kapsle o tvrdou podložku, aby se uvolnil prášek (obr. 1).

3. AKTIVACE KAPSELE A MICHÁNÍ
- Před aktivací kapsle ji zatřepájte nebo poklepejte boční stranou kapsle o tvrdou podložku, aby se uvolnil prášek (obr. 1).

3. AKTIVACE KAPSELE A MICHÁNÍ
- Před aktivací kapsle ji zatřepájte nebo poklepejte boční stranou kapsle o tvrdou podložku, aby se uvolnil prášek (obr. 1).

3. AKTIVACE KAPSELE A MICHÁNÍ
- Před aktivací kapsle ji zatřepájte nebo poklepejte boční stranou kapsle o tvrdou podložku, aby se uvolnil prášek (obr. 1).

3. AKTIVACE KAPSELE A MICHÁNÍ
- Před aktivací kapsle ji zatřepájte nebo poklepejte boční stranou kapsle o tvrdou podložku, aby se uvolnil prášek (obr. 1).

3. AKTIVACE KAPSELE A MICHÁNÍ
- Před aktivací kapsle ji zatřepájte nebo poklepejte boční stranou kapsle o tvrdou podložku, aby se uvolnil prášek (obr. 1).

3. AKTIVACE KAPSELE A MICHÁNÍ
- Před aktivací kapsle ji zatřepájte nebo poklepejte boční stranou kapsle o tvrdou podložku, aby se uvolnil prášek (obr. 1).

3. AKTIVACE KAPSELE A MICHÁNÍ
- Před aktivací kapsle ji zatřepájte nebo poklepejte boční stranou kapsle o tvrdou podložku, aby se uvolnil prášek (obr. 1).

3. AKTIVACE KAPSELE A MICHÁNÍ
- Před aktivací kapsle ji zatřepájte nebo poklepejte boční stranou kapsle o tvrdou podložku, aby se uvolnil prášek (obr. 1).

3. AKTIVACE KAPSELE A MICHÁNÍ
- Před aktivací kapsle ji zatřepájte nebo poklepejte boční stranou kapsle o tvrdou podložku, aby se uvolnil prášek (obr. 1).

3. AKTIVACE KAPSELE A MICHÁNÍ
- Před aktivací kapsle ji zatřepájte nebo poklepejte boční stranou kapsle o tvrdou podložku, aby se uvolnil prášek (obr. 1).

3. AKTIVACE KAPSELE A MICHÁNÍ
- Před aktivací kapsle ji zatřepájte nebo poklepejte boční stranou kapsle o tvrdou podložku, aby se uvolnil prášek (obr. 1).

3. AKTIVACE KAPSELE A MICHÁNÍ
- Před aktivací kapsle ji zatřepájte nebo poklepejte boční stranou kapsle o tvrdou podložku, aby se uvolnil prášek (obr. 1).

3. AKTIVACE KAPSELE A MICHÁNÍ
- Před aktivací kapsle ji zatřepájte nebo poklepejte boční stranou kapsle o tvrdou podložku, aby se uvolnil prášek (obr. 1).

3. AKTIVACE KAPSELE A MICHÁNÍ
- Před aktivací kapsle ji zatřepájte nebo poklepejte boční stranou kapsle o tvrdou podložku, aby se uvolnil prášek (obr. 1).

3. AKTIVACE KAPSELE A MICHÁNÍ
- Před aktivací kapsle ji zatřepájte nebo poklepejte boční stranou kapsle o tvrdou podložku, aby se uvolnil prášek (obr. 1).

Пред použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie. **SK**

GC Fuji PLUS™ CAPSULE

RADIOOPAKY ZOSILNENÝ SKLONDOMERNÝ FIKSAČNÝ CEMENT V KAPSULÁCH

Na použitie len zubným lekárom v indikáciách na použitie.

INDIKÁCIE PRE POUŽITIE

- Cementovanie všetkých typov kovových inlejev, onlejev, koruniek a 2. triedy inlejev, onlejev, onlejev, prevlek in mostíčkoch.
- Cementovanie všetkých typov živýchcových inlejev, onlejev, koruniek a mostíkov.
- Cementovanie všetkých keramikých inlejev.
- Cementovanie všetkých keramikých a mostíkov vyrobených z keramiky s vysokou pevnosťou (na báze zirkónia).
- Cementovanie kovových a keramikých čapov a čapov vyrobených sklenenými vláknami (fiber posts).

KONTRAINDIKÁCIE

- Priame prekrytie pulpy.
- Nepoužívajte tento produkt u pacientov so známu alergiou na sklondomerný cement, metakrylátový monoméer alebo metakrylátový polymér.

ZLOŽENIE

Prášok: Fluor-hinito-silikátové sklo, Inicialtor, Pigment Kvapalina: Metakrylát, Destilovaná voda, Kyselina polyakrylová, Dimetakrát, Kyselina karboxylová

Rozmerje prah / tečnosť (g/g)	0,36 / 0,18
Čas miešania (sek.)	10*
Delovni čas (pri 23°C) (min., sek.)	200*
Kövénemesiaz (37°C/99°F) (min., sek.)	415*

ISO 9917-2 Triedy 1, Cementovanie Radiopákové Niegno radioopazné je enaka 2,1 mm ali 210% hlinika. (Radioaktívna hlinika je porovnateľná s dentinom.)

PRIPRAVA ZUBA

- Príprava zub bezŕnym spôsobom. Na prekrytie priame prekrytie pulpy použite hydroxid väpnatý, a) Vyčistite preparovaný zub netouzou a vodou. Poznamka: Vozovku účinkou alebo spongiou aplikujte GC Fuji PLUS CONDITIONER po dobu 20 sekúnd. c) Dôkladne opláchnite vodou. Prebytok vlhkosti odstráňte vatovým tampónom alebo vysušte mieriym výfukným vzduchom. NEPRESUŠUJTE. Najlepší výsledok sa dosiahne, keď sa preparovaný povrch javí vlhký (lesklý).
- PRIPRAVA NÁHRADY a) Príprava náhrady je zhotovená a predpripravená podľa inštrukcií výrobcu. b) Aktivácia kapsule A MIESANIE Uistite sa, že náhrada je zhotovená a frou kľepnote o tvrdý povrch, aby sa uvoľnil prášok (obr. 1).

AKTIVÁCIA KAPSULE A MIESANIE

- Da kapsulu otvoríte pred miešaním a frou kľepnote o tvrdý povrch, aby sa uvoľnil prášok (obr. 1).
- Kapsulu aktivujte upitým zafarbeným piesta do hlavného telesa kapsule a podržte ju 2 sekundy (obr. 2).
- Poznamka: c) Pred aktiváciou potreste kapsulu ali udarite z ju po ob tvrd povrchu, Da sprstote práh (slika 1.). d) Da kapsulu otvoríte pred miešaním bat do konca v kapsulu, da je porpanav z ohišjem kapsule in držte 2 sekundy (slika 2).
- Opozorilo: a) Zgotovite da je bat pritisnený do konca v kapsulu, Da se izognete nepravilnomo rozmeru prah in tečnoto. b) Kapsulu treba aktivovať tek neprosedno pre miešania o očiama. c) Takto ju vstavte v mešalce (ali amalgamator) in mešajte 10 sekúnd (+/- 4.000 obrátov) (slika 3.).

CEMENTOVANIE

- Poznamka: a) Používajte da je bat pritisnený do konca v kapsulu, Da se izognete nepravilnomo rozmeru prah in tečnoto. b) Kapsulu treba aktivovať tek neprosedno pre miešania o očiama. c) Takto ju vstavte v mešalce (ali amalgamator) in mešajte 10 sekúnd (+/- 4.000 obrátov) (slika 3.).
- Poznamka: a) Používajte da je bat pritisnený do konca v kapsulu, Da se izognete nepravilnomo rozmeru prah in tečnoto. b) Kapsulu treba aktivovať tek neprosedno pre miešania o očiama. c) Takto ju vstavte v mešalce (ali amalgamator) in mešajte 10 sekúnd (+/- 4.000 obrátov) (slika 3.).

DAVČOVANIE

- Ak používate rotácijský zmiešavaci prístroj, nepoužívajte mostičkové rotácijsky.
- Okamžite vyberte kapsulu a vložte ju do GC APPLIKAČNÝCH KLEŠŤÍ. Uistite sa, že náhrada je zhotovená a frou kľepnote o tvrdý povrch, aby sa uvoľnil prášok (obr. 1).

CEMENTOVANIE

- Uistite sa, že náhrada je zhotovená a frou kľepnote o tvrdý povrch, aby sa uvoľnil prášok (obr. 1).
- Kapsulu otvoríte pred miešaním a frou kľepnote o tvrdý povrch, aby sa uvoľnil prášok (obr. 1).
- Poznamka: a) Používajte da je bat pritisnený do konca v kapsulu, Da se izognete nepravilnomo rozmeru prah in tečnoto. b) Kapsulu treba aktivovať tek neprosedno pre miešania o očiama. c) Takto ju vstavte v mešalce (ali amalgamator) in mešajte 10 sekúnd (+/- 4.000 obrátov) (slika 3.).

SKLADOVANIE

Pre zachovanie optimálnych vlastností je doporučované skladovať kapsule v originálnej alumínovej fólii na tmavom a chladnom mieste 4-25°C (39-77,0°F).

ODTENE

A3 (Vita® odieň) Vita® je registrovaná obchodná značka spoločnosti Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Nemecko.

BALENIE

50 kapsul Priemerný obsah jednej kapsule: 0,36 g práhu o 0,18 g (0,16 mL) tekutiny

OPOMIENIE

Minimálny objem namiešaného cementu je 0,19 mL. V prípade potreby použite viac vody a vyfúkaťe lekársku pomoc.

OPOMIENIE

1. V prípade kontaktu s listnou dutinou alebo pokožkou ihneď odstráňte produkt alebo vodu namočenou v alkohole. Opláchnite vodou. Na izoláciu operačného poľa od krvi alebo pokožky sa môže použiť izolácia COCOA BUTTER.

OPOMIENIE

2. V prípade kontaktu s očami ihneď vypláchnite vodou a vyfúkaťe lekársku pomoc.

OPOMIENIE

3. GC Fuji PLUS CONDITIONER obsahuje 2% železovú klorid. Uporaba radiopákového cementu v kombinácii s 2% železovú kloridom môže spôsobiť zafarbenie tkanív v priľahlých oblastiach.

OPOMIENIE

4. Nepoužívajte GC Fuji PLUS CAPSULE v kombinácii s materiálmi obsahujúcimi eugenol, pretože eugenol môže dôjsť k zafarbeniu tkanív v priľahlých oblastiach.

OPOMIENIE

5. Nepoužívajte GC Fuji PLUS CAPSULE v kombinácii s materiálmi obsahujúcimi eugenol, pretože eugenol môže dôjsť k zafarbeniu tkanív v priľahlých oblastiach.

OPOMIENIE

6. V ojedinelých prípadoch môže výrobok spôsobiť citlivosť u niektorých osôb. Ak sa vyskytne takáto reakcia, prerušte použitie výrobku a vyhľadajte lekára.

OPOMIENIE

7. Vždy používajte ochranné pomôcky ako rukavice, masku a ochranný kryt očí.

OPOMIENIE

Nekateré výrobky uvádzané v návode na použitie, môžu byť klasifikované ako nebezpečné podľa GHS. Vždy sa obozručte s bezpečnostnými kartami, ktoré sú k dispozícii na adrese: <https://www.gc.dental/europe>

OPOMIENIE

Môžete ích tiež zistiť od svojho dodávateľa.

OPOMIENIE

Súkň bezpečnosti a klinického výkonu (SSCP) nájdete v databáze EUDAMED (<https://ec.europa.eu/tools/eudamed>) ali na kontaktných kartách, ktoré sú k dispozícii na adrese: <https://www.gc.dental/europe>

OPOMIENIE

Môžete ích tiež zistiť od svojho dodávateľa.

OPOMIENIE

Nekateré výrobky uvádzané v návode na použitie, môžu byť klasifikované ako nebezpečné podľa GHS. Vždy sa obozručte s bezpečnostnými kartami, ktoré sú k dispozícii na adrese: <https://www.gc.dental/europe>

OPOMIENIE

Môžete ích tiež zistiť od svojho dodávateľa.

OPOMIENIE

Nekateré výrobky uvádzané v návode na použitie, môžu byť klasifikované ako nebezpečné podľa GHS. Vždy sa obozručte s bezpečnostnými kartami, ktoré sú k dispozícii na adrese: <https://www.gc.dental/europe>

OPOMIENIE

Môžete ích tiež zistiť od svojho dodávateľa.

OPOMIENIE

Nekateré výrobky uvádzané v návode na použitie, môžu byť klasifikované ako nebezpečné podľa GHS. Vždy sa obozručte s bezpečnostnými kartami, ktoré sú k dispozícii na adrese: <https://www.gc.dental/europe>

OPOMIENIE

Môžete ích tiež zistiť od svojho dodávateľa.

OPOMIENIE

Nekateré výrobky uvádzané v návode na použitie, môžu byť klasifikované ako nebezpečné podľa GHS. Vždy sa obozručte s bezpečnostnými kartami, ktoré sú k dispozícii na adrese: <https://www.gc.dental/europe>

OPOMIENIE

Môžete ích tiež zistiť od svojho dodávateľa.

OPOMIENIE

Nekateré výrobky uvádzané v návode na použitie, môžu byť klasifikované ako nebezpečné podľa GHS. Vždy sa obozručte s bezpečnostnými kartami, ktoré sú k dispozícii na adrese: <https://www.gc.dental/europe>

Пред употребo предварительно прeчитайте инструкцию на употребo. **SL**

GC Fuji PLUS™ CAPSULE

RADIOOPAKY OJACANI STEKLASO JONOMERNI CEMENT ZA LEPLJENJE V KAPSULAH

Uporaba samo za profesionalne namene in za priporočene indikacije.

INDIKACIJE ZA UPORABO

- Cementiranje kovinskih inlejev, onlejev, prevlek in mostíčkov.
- Cementiranje živihcov inlejev, onlejev, prevlek in mostíčkov.
- Cementiranje potkov keramiknih inlejev.
- Cementiranje kovinskih (cikronjevih) polno keramiknih prevlek in mostíkov.
- Cementiranje keramiknih, keramiknih ali vlakeni kovnih zatičkov.

KONTRAINDIKACIJE

- Priame prekrytie pulpe.
- Nepoužívajte žele z izdelka pri pacientih z známo alergiou na sklondomerný cemente, metakrilitné monoméer ali metakrilitné polimere.

SESTAVA

Prah: Flor-aluminijskó silikátové sklo, Inicialtor, Pigment Tekočina: Metakrilit, Destilovaná voda, Poliakrilitná kyselina, Dimetakrilit, Karboksilná kyselina

NAVODILA ZA UPORABO

Rozmerje prah / tečnosť (g/g)	0,36 / 0,18
Čas miešania (sek.) <td>10*</td>	10*
Delovni čas (pri 23°C) (min., sek.) <td>200*</td>	200*
Kövénemesiaz (37°C/99°F) (min., sek.) <td>415*</td>	415*

ISO 9917-2 Triedy 1, Cementovanie Radiopákové Niegno radioopazné je enaka 2,1 mm ali 210% hlinika. (Radioaktívna hlinika je porovnateľná s dentinom.)

PRIPRAVA ZUBA

- Príprava zub bezŕnym spôsobom. Na prekrytie priame prekrytie pulpy použite hydroxid väpnatý, a) Vyčistite preparovaný zub netouzou a vodou. Poznamka: Vozovku účinkou alebo spongiou aplikujte GC Fuji PLUS CONDITIONER po dobu 20 sekúnd. c) Dôkladne opláchnite vodou. Prebytok vlhkosti odstráňte vatovým tampónom alebo vysušte mieriym výfukným vzduchom. NEPRESUŠUJTE. Najlepší výsledok sa dosiahne, keď sa preparovaný povrch javí vlhký (lesklý).
- PRIPRAVA NÁHRADY a) Príprava náhrady je zhotovená a predpripravená podľa inštrukcií výrobcu. b) Aktivácia kapsule A MIESANIE Uistite sa, že náhrada je zhotovená a frou kľepnote o tvrdý povrch, aby sa uvoľnil prášok (obr. 1).

AKTIVÁCIA KAPSULE A MIESANIE

- Da kapsulu otvoríte pred miešaním a frou kľepnote o tvrdý povrch, aby sa uvoľnil prášok (obr. 1).
- Kapsulu otvoríte pred miešaním a frou kľepnote o tvrdý povrch, aby sa uvoľnil prášok (obr. 1).
- Poznamka: a) Používajte da je bat pritisnený do konca v kapsulu, Da se izognete nepravilnomo rozmeru prah in tečnoto. b) Kapsulu treba aktivovať tek neprosedno pre miešania o očiama. c) Takto ju vstavte v mešalce (ali amalgamator) in mešajte 10 sekúnd (+/- 4.000 obrátov) (slika 3.).

CEMENTOVANIE

- Poznamka: a) Používajte da je bat pritisnený do konca v kapsulu, Da se izognete nepravilnomo rozmeru prah in tečnoto. b) Kapsulu treba aktivovať tek neprosedno pre miešania o očiama. c) Takto ju vstavte v mešalce (ali amalgamator) in mešajte 10 sekúnd (+/- 4.000 obrátov) (slika 3.).

DAVČOVANIE

- Ak používate rotácijský zmiešavaci prístroj, nepoužívajte mostičkové rotácijsky.
- Okamžite vyberte kapsulu a vložte ju do GC APPLIKAČNÝCH KLEŠŤÍ. Uistite sa, že náhrada je zhotovená a frou kľepnote o tvrdý povrch, aby sa uvoľnil prášok (obr. 1).

CEMENTOVANIE

Uistite sa, že náhrada je zhotovená a frou kľepnote o tvrdý povrch, aby sa uvoľnil prášok (obr. 1).

OPOMIENIE

1. V prípade kontaktu s listnou dutinou alebo pokožkou ihneď odstráňte produkt alebo vodu namočenou v alkohole. Opláchnite vodou. Na izoláciu operačného poľa od krvi alebo pokožky sa môže použiť izolácia COCOA BUTTER.

OPOMIENIE

2. V prípade kontaktu s očami ihneď vypláchnite vodou a vyfúkaťe lekársku pomoc.

OPOMIENIE

3. GC Fuji PLUS CONDITIONER obsahuje 2% železovú klorid. Uporaba radiopákového cementu v kombinácii s 2% železovú kloridom môže spôsobiť zafarbenie tkanív v priľahlých oblastiach.

OPOMIENIE

4. Nepoužívajte GC Fuji PLUS CAPSULE v kombinácii s materiálmi obsahujúcimi eugenol, pretože eugenol môže dôjsť k zafarbeniu tkanív v priľahlých oblastiach.

OPOMIENIE

5. Nepoužívajte GC Fuji PLUS CAPSULE v kombinácii s materiálmi obsahujúcimi eugenol, pretože eugenol môže dôjsť k zafarbeniu tkanív v priľahlých oblastiach.

OPOMIENIE

6. V ojedinelých prípadoch môže výrobok spôsobiť citlivosť u niektorých osôb. Ak sa vyskytne takáto reakcia, prerušte použitie výrobku a vyhľadajte lekára.

OPOMIENIE

7. Vždy používajte ochranné pomôcky ako rukavice, masku a ochranný kryt očí.

OPOMIENIE

Nekateré výrobky uvádzané v návode na použitie, môžu byť klasifikované ako nebezpečné podľa GHS. Vždy sa obozručte s bezpečnostnými kartami, ktoré sú k dispozícii na adrese: <https://www.gc.dental/europe>

OPOMIENIE

Môžete ích tiež zistiť od svojho dodávateľa.

OPOMIENIE

Nekateré výrobky uvádzané v návode na použitie, môžu byť klasifikované ako nebezpečné podľa GHS. Vždy sa obozručte s bezpečnostnými kartami, ktoré sú k dispozícii na adrese: <https://www.gc.dental/europe>

OPOMIENIE

Môžete ích tiež zistiť od svojho dodávateľa.

OPOMIENIE

Nekateré výrobky uvádzané v návode na použitie, môžu byť klasifikované ako nebezpečné podľa GHS. Vždy sa obozručte s bezpečnostnými kartami, ktoré sú k dispozícii na adrese: <https://www.gc.dental/europe>

OPOMIENIE

Môžete ích tiež zistiť od svojho dodávateľa.

OPOMIENIE

Nekateré výrobky uvádzané v návode na použitie, môžu byť klasifikované ako nebezpečné podľa GHS. Vždy sa obozručte s bezpečnostnými kartami, ktoré sú k dispozícii na adrese: <https://www.gc.dental/europe>

OPOMIENIE

Môžete ích tiež zistiť od svojho dodávateľa.

OPOMIENIE

Nekateré výrobky uvádzané v návode na použitie, môžu byť klasifikované ako nebezpečné podľa GHS. Vždy sa obozručte s bezpečnostnými kartami, ktoré sú k dispozícii na adrese: <https://www.gc.dental/europe>

OPOMIENIE

Môžete ích tiež zistiť od svojho dodávateľa.

OPOMIENIE

Nekateré výrobky uvádzané v návode na použitie, môžu byť klasifikované ako nebezpečné podľa GHS. Vždy sa obozručte s bezpečnostnými kartami, ktoré sú k dispozícii na adrese: <https://www.gc.dental/europe>

OPOMIENIE

Môžete ích tiež zistiť od svojho dodávateľa.

OPOMIENIE

Nekateré výrobky uvádzané v návode na použitie, môžu byť klasifikované ako nebezpečné podľa GHS. Vždy sa obozručte s bezpečnostnými kartami, ktoré sú k dispozícii na adrese: <https://www.gc.dental/europe>

OPOMIENIE

Môžete ích tiež zistiť od svojho dodávateľa.

OPOMIENIE

Nekateré výrobky uvádzané v návode na použitie, môžu byť klasifikované ako nebezpečné podľa GHS. Vždy sa obozručte s bezpečnostnými kartami, ktoré sú k dispozícii na adrese: <https://www.gc.dental/europe>

OPOMIENIE

Môžete ích tiež zistiť od svojho dodávateľa.

OPOMIENIE

Nekateré výrobky uvádzané v návode na použitie, môžu byť klasifikované ako nebezpečné podľa GHS. Vždy sa obozručte s bezpečnostnými kartami, ktoré sú k dispozícii na adrese: <https://www.gc.dental/europe>

OPOMIENIE

Môžete ích tiež zistiť od svojho dodávateľa.

OPOMIENIE

Nekateré výrobky uvádzané v návode na použitie, môžu byť klasifikované ako nebezpečné podľa GHS. Vždy sa obozručte s bezpečnostnými kartami, ktoré sú k dispozícii na adrese: <https://www.gc.dental/europe>

OPOMIENIE

Môžete ích tiež zistiť od svojho dodávateľa.

OPOMIENIE

Nekateré výrobky uvádzané v návode na použitie, môžu byť klasifikované ako nebezpečné podľa GHS. Vždy sa obozručte s bezpečnostnými kartami, ktoré sú k dispozícii na adrese: <https://www.gc.dental/europe>

OPOMIENIE

Môžete ích tiež zistiť od svojho dodávateľa.

OPOMIENIE

Nekateré výrobky uvádzané v návode na použitie, môžu byť klasifikované ako nebezpečné podľa GHS. Vždy sa obozručte s bezpečnostnými kartami, ktoré sú k dispozícii na adrese: <https://www.gc.dental/europe>

Pre употребo pažljivo pročítajte uputstvo. **SR**

GC Fuji PLUS™ CAPSULE

OJACANI RENDGENSKI VIDLJIV GLASJONOMERNI CEMENT ZA CEMENTIRANJE V KAPSULAMA

Samo za stručno stomatološku upotrebu u indikacijama za upotrebu.

INDIKACIJE ZA UPOTREBU

- Cementiranje inleja, onleja, krunica i mostova sa metalnom mostovcu.
- Cementiranje kompozitnih inleja, onleja, krunica i mostova.
- Cementiranje potkov keramiknih inleja.
- Cementiranje kovinskih (cikronjevih) polno keramiknih prevlek in mostíkov.
- Cementiranje keramiknih, keramiknih ili vlakeni kovnih zatičkov.

KONTRAINDIKACIJE

- Direktno prekrytie pulpy.
- Nepoužívajte žele z izdelka pri pacientih z známo alergiou na sklondomerný cemente, metakrilitné monoméer ali metakrilitné polimere.

SESTAVA

Prah: Flor-aluminijskó silikátové sklo, Inicialtor, Pigment Tekočina: Metakrilit, Destilovaná voda, Poliakrilitná kyselina, Dimetakrilit, Karboksilná kyselina

UPUTSTVO ZA RAD

Odnoš prah / tečnosť (g/g)	0,36 / 0,18
Vreme miešanja (sek.) <td>10*</td>	10*
Delovni vreme (pri 23°C) (min., sek.) <td>200*</td>	200*
Serletenje Suresi (37°C/99°F) (min., sek.) <td>415*</td>	415*

ISO 9917-2 Klasa 1, Fiksacija Radiopákové Niegno radioopazné je ekvivalentna 2,1 mm ili 210% aluminijuma. (Radioopaznost aluminijuma je uporediva sa dentinom.)

PRIPRAVA ZUBA

- Príprava zub bezŕnym spôsobom. Na prekrytie priame prekrytie pulpy použite hydroxid väpnatý, a) Vyčistite preparovaný zub netouzou a vodou. Poznamka: Vozovku účinkou alebo spongiou aplikujte GC Fuji PLUS CONDITIONER po dobu 20 sekúnd. c) Dôkladne opláchnite vodou. Prebytok vlhkosti odstráňte vatovým tampónom alebo vysušte mieriym výfukným vzduchom. NEPRESUŠUJTE. Najlepší rezultat postupu se ako sa pripravuje površnje još vlažne (sjaju se).
- PRIPRAVA PROTETIČKOG RADA. Osigurati da je protetik rad prethodno obraden u skladu sa uputstvom proizvođača. a)